Физический факультет
Московского
государственного университета
имени М.В.Ломоносова

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЗАДАЧЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ И СТРУКТУРНЫХ ФУНКЦИЙ ЭЛЕКТРОРОЖДЕНИЯ ОДИНОЧНОГО ПИОНА НА ПРОТОНЕ В РЕЗОНАНСНОЙ ОБЛАСТИ

Магистерская работа студентки 213М группы

Чистяковой Влады Витальевны

Научный руководитель:

к.ф.-м.н., с.н.с. Исупов Евгений Леонидович

Москва, 2025

Предмет исследования

Зависимость константы сильного взаимодействия от расстояния

Электромагнитное возбуждение нуклонных резонансов

Исследование нуклонных резонансов – наиболее удобный инструмент для изучения динамики сильного взаимодействия в непертурбативной области

Вершина $\gamma_\nu p N^*$ может быть охарактеризована
 тремя амплитудами $A_{1/2}$, $A_{3/2}$, $S_{1/2}$

Ускоритель CEBAF и детектор CLAS Лаборатории Томаса Джефферсона (Jefferson Lab)

CLAS Physics Database

(создана в коллаборации между Hall B at Jefferson Lab и ОЭПВАЯ НИИЯФ МГУ)

Experimental Hall B

CLAS Physics Database

[JLab](#) | [Search](#) | [Overview](#) | [Login](#) | [Edit](#) | [Register](#)

Search form for the data related to the CLAS physics

You are not logged in. [Login](#).

Select reaction:			
Beam: any <input data-bbox="318 678 343 692" type="button" value="?"/>	Target: any <input data-bbox="700 678 726 692" type="button" value="?"/>	Final state: any <input data-bbox="1133 678 1159 692" type="button" value="?"/>	
polarization: none <input data-bbox="394 735 420 749" type="button" value="?"/>	polarization: any <input data-bbox="726 735 751 749" type="button" value="?"/>	polarization: any <input data-bbox="1057 735 1082 749" type="button" value="?"/>	
Select kinematics range:			
☐ Search for average values <input data-bbox="904 835 930 849" type="button" value="?"/>			
Q ² _{min} , [GeV] ² : <input data-bbox="496 878 675 906" type="text" value=""/>	Q ² _{max} , [GeV] ² : <input data-bbox="1006 878 1184 906" type="text" value=""/>		
W _{min} , [GeV]: <input data-bbox="496 921 675 949" type="text" value=""/>	W _{max} , [GeV]: <input data-bbox="1006 921 1184 949" type="text" value=""/>		
X _{min} : <input data-bbox="496 963 675 992" type="text" value=""/>	X _{max} : <input data-bbox="1006 963 1184 992" type="text" value=""/>		
EY _{min} , [GeV]: <input data-bbox="496 1006 675 1035" type="text" value=""/>	EY _{max} , [GeV]: <input data-bbox="1006 1006 1184 1035" type="text" value=""/>		
Select observables:			
Quantity measured:	<input data-bbox="586 1106 1108 1135" type="text" value="any"/> dσ/dΩ (exclusive) dσ/dΩ (quasi-free) σ (exclusive) sigma sigma (quasi-free)		

Additional search criteria:	
Spokespersons:	<input data-bbox="1702 364 2331 392" type="text" value=""/>
Year:	<input data-bbox="1702 406 2331 435" type="text" value=""/>
Experiment identifier(s):	<input data-bbox="1702 449 2331 478" type="text" value=""/>
Text table options	
☐ Show results as a plain text table <input data-bbox="1796 549 1821 564" type="button" value="?"/>	☐ Show average value for W, Q ² ranges <input data-bbox="2305 549 2331 564" type="button" value="?"/>
☐ Add W and Q ² columns	How to save text data
[-] Search Results Table Composition <input data-bbox="2076 642 2102 656" type="button" value="?"/>	

Available fields:

Final state polarization
Beam
Beam polarization
Target
Target polarization
x min
x max
EY min
EY max
W

Fields selected for output:

Measurement identifier
Final state
Q²min
Q²max
W min
W max
Quantity
Experiment title
Authors
Year

Limit: Results in a new window

clas.sinp.msu.ru

База данных по дифференциальным сечениям реакции $\gamma p \rightarrow p\pi^0$

	Ebeam	W	Q2	cos_theta	phi	dsigma_dOmega	error
0	1.64	1.1000	0.40	-0.9	0.261799	0.912000	0.982353
1	1.64	1.1000	0.40	-0.9	0.785398	0.175000	0.356108
2	1.64	1.1000	0.40	-0.9	1.308997	1.650000	2.769879
3	1.64	1.1000	0.40	-0.9	1.832596	0.560000	0.979330
4	1.64	1.1000	0.40	-0.9	2.356194	1.130000	0.909689
...	...	...	...	...	...	...	...
76244	2.04	1.7875	0.65	0.9	5.105088	0.497479	0.107885
76245	2.04	1.7875	0.65	0.9	5.366887	2.774690	2.426200
76246	2.04	1.7875	0.65	0.9	5.628687	5.130680	4.529040
76247	2.04	1.7875	0.65	0.9	5.890486	2.657480	2.404660
76248	2.04	1.7875	0.65	0.9	6.152286	8.551600	6.940400

76249 rows × 7 columns

$Q^2 = 4E_e E'_e \sin^2 \frac{\theta_e}{2}$ - квадрат переданного
четырёхимпульса виртуального фотона

E_e, E'_e - энергия начального и рассеянного
электронов

$\theta_e = \arccos \frac{p'_z}{E'_e}$ - угол рассеяния электрона

$W = M_p^2 + 2M_p(E_e - E'_e) - Q^2$ -
инвариантная масса конечных адронов

$E_e \in [1.64; 2.04; 2.44; 5.75]$ ГэВ

Дифференциальное сечение рождения одиночного пиона

$$\frac{d\sigma_{\gamma\nu}}{d\Omega_{\pi}} = \frac{d\sigma_u}{d\Omega_{\pi}} + \varepsilon \frac{d\sigma_{tt}}{d\Omega_{\pi}} \cdot \cos 2\varphi_{\pi} + \sqrt{2\varepsilon(1+\varepsilon)} \frac{d\sigma_{lt}}{d\Omega_{\pi}} \cdot \cos \varphi_{\pi}$$

$$\frac{d\sigma_u}{d\Omega_{\pi}} = \frac{d\sigma_t}{d\Omega_{\pi}} + \varepsilon \frac{d\sigma_l}{d\Omega_{\pi}}$$

или в более компактном виде: $\frac{d\sigma_{\gamma\nu}}{d\Omega_{\pi}} = A + B \cos 2\varphi_{\pi} + C \cos \varphi_{\pi}$

$$\frac{d\sigma_t}{d\Omega_{\pi}}, \frac{d\sigma_l}{d\Omega_{\pi}}, \frac{d\sigma_{lt}}{d\Omega_{\pi}}, \frac{d\sigma_{tt}}{d\Omega_{\pi}} \quad - \quad \text{поперечная, продольная, продольно-}$$

поперечная, поперечно-поперечная структурные функции
соответственно

$$\varepsilon = \left(1 + 2 \left(1 + \frac{v^2}{Q^2} \right) \tan^2 \frac{\theta_e}{2} \right)^{-1} \quad - \quad \text{поляризация виртуального фотона}$$

$$v = E_e - E'_e \quad - \quad \text{переданная электроном энергия}$$

θ_{π} – полярный угол вылета пиона в системе центра масс «виртуальный фотон-протон»

φ_{π} – угол между плоскостью рассеяния электрона и плоскостью реакции

Цель работы

Цель моей работы заключается в построении алгоритма для описания дифференциальных сечений реакции электроророждения одиночного пиона на протоне, способного осуществлять надёжную интерполяцию данных в пятимерном пространстве

Алгоритм XGBoost

Предсказанные дифференциальные сечения реакции $\gamma\nu p \rightarrow p \pi^0$ (алгоритм XGBoost)

Фитирование:
$$\frac{d\sigma_{\gamma\nu}}{d\Omega_{\pi}} = A + B\cos 2\varphi_{\pi} + C\cos\varphi_{\pi}$$

Полносвязная нейронная сеть (многослойный персептрон)

input layer

19 hidden layers

output layer

...

Standardization: $x' = \frac{x - \mu}{\sigma}$

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$

Min-max normalization:

$$x' = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

Предсказанные дифференциальные сечения реакции $\gamma\nu p \rightarrow p \pi^0$ (нейронная сеть)

Фитирование:
$$\frac{d\sigma_{\gamma\nu}}{d\Omega_{\pi}} = A + B\cos 2\varphi_{\pi} + C\cos\varphi_{\pi}$$

Предсказанные структурные функции $\gamma_\nu p \rightarrow p \pi^0$ (нейронная сеть)

$$A(E_e, Q^2, W, \cos \theta_\pi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma_{\gamma\nu}(\varphi_\pi)}{d\Omega_\pi} d\varphi_\pi$$

$$B(E_e, Q^2, W, \cos \theta_\pi) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma_{\gamma\nu}(\varphi_\pi)}{d\Omega_\pi} \cos 2\varphi_\pi d\varphi_\pi$$

$$C(E_e, Q^2, W, \cos \theta_\pi) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma_{\gamma\nu}(\varphi_\pi)}{d\Omega_\pi} \cos \varphi_\pi d\varphi_\pi$$

Зависимость метрик и функции потерь от эпохи для валидационной и тренировочной выборок при обучении полносвязной нейронной сети

Объединённая база данных по дифференциальным сечениям реакций $\gamma\nu p \rightarrow p \pi^0$ и $\gamma\nu p \rightarrow n \pi^+$

	Ebeam	W	Q2	cos_theta	phi	dsigma_dOmega	error	cos_phi	sin_phi	reaction_type
0	1.640	1.10	0.4	-0.900	0.261799	0.9120	0.982353	0.965926	0.258819	1
1	1.640	1.10	0.4	-0.900	0.785398	0.1750	0.356108	0.707107	0.707107	1
2	1.640	1.10	0.4	-0.900	1.308997	1.6500	2.769879	0.258819	0.965926	1
3	1.640	1.10	0.4	-0.900	1.832596	0.5600	0.979330	-0.258819	0.965926	1
4	1.640	1.10	0.4	-0.900	2.356194	1.1300	0.909689	-0.707107	0.707107	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
160831	5.499	2.01	4.0	0.975	3.730641	0.1012	0.043165	-0.831470	-0.555570	0
160832	5.499	2.01	4.0	0.975	3.992441	0.1199	0.076638	-0.659346	-0.751840	0
160833	5.499	2.01	4.0	0.975	4.646939	0.1578	0.095391	-0.065403	-0.997859	0
160834	5.499	2.01	4.0	0.975	4.777839	0.2346	0.158557	0.065403	-0.997859	0
160835	5.499	2.01	4.0	0.975	6.086836	0.1250	0.077753	0.980785	-0.195090	0

160836 rows × 10 columns

$E_{beam}(\gamma\nu p \rightarrow n \pi^+) \in [1.515; 5.499; 5.754]$ ГэВ

$E_{beam}(\gamma\nu p \rightarrow p \pi^0) \in [1.64; 2.04; 2.44; 5.75]$ ГэВ

Предсказанные дифференциальные сечения реакции $\gamma\nu p \rightarrow n \pi^+$ (нейронная сеть)

Фитирование:
$$\frac{d\sigma_{\gamma\nu}}{d\Omega_{\pi}} = A + B\cos 2\varphi_{\pi} + C\cos\varphi_{\pi}$$

Предсказанные структурные функции $\gamma_\nu p \rightarrow n \pi^+$ (нейронная сеть)

$$A(E_e, Q^2, W, \cos \theta_\pi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma_{\gamma_\nu}(\varphi_\pi)}{d\Omega_\pi} d\varphi_\pi$$

$$B(E_e, Q^2, W, \cos \theta_\pi) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma_{\gamma_\nu}(\varphi_\pi)}{d\Omega_\pi} \cos 2\varphi_\pi d\varphi_\pi$$

$$C(E_e, Q^2, W, \cos \theta_\pi) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma_{\gamma_\nu}(\varphi_\pi)}{d\Omega_\pi} \cos \varphi_\pi d\varphi_\pi$$

Результаты работы

- разработан алгоритм на основе полносвязной нейронной сети для предсказания дифференциальных сечений электророждения одиночного пиона в реакции $\gamma_\nu p \rightarrow p \pi^0$;
- качество работы нейронной сети проверяется путём построения зависимости структурных функций от инвариантной массы системы конечных адронов исследуемой реакции;
- ведётся работа по улучшению алгоритма, в настоящее время модель обучается на объединённой базе данных реакций $\gamma_\nu p \rightarrow p \pi^0$ и $\gamma_\nu p \rightarrow n \pi^+$, вносятся корректировки в архитектуру сети;
- по результатам работы были опубликованы статьи:
 - *Golda A.V., Rusova A.A., Isupov E.L., Chistyakova V.V.* Machine Learning Approach in the Prediction of Differential Cross Sections and Structure Functions of Single Pion Electroproduction in the Resonance Region // Moscow University Physics Bulletin. 2024. **79**. P. 608-621.
 - *Чистякова В.В., Голда А.В., Русова А.А., Исупов Е.Л.* Машинное обучение в задаче предсказания дифференциальных сечений и структурных функций электророждения пионов в резонансной области // Учен. зап. физ. фак-та Моск. ун-та. 2025. **2**. 2520213.

Спасибо за внимание!

Доступная в эксперименте кинематическая область

Измеренные наблюдаемые эксклюзивных реакций

Конечное адронное состояние	Диапазон по W , ГэВ	Диапазон по Q^2 , ГэВ ²	Измеренные наблюдаемые
$p \pi^0$	1.10-1.38	0.16-0.36	$\frac{d\sigma}{d\Omega}$
	1.1125-1.7875	0.45-0.95	$\frac{d\sigma}{d\Omega}$
	1.10-1.68	0.40-1.15	$\frac{d\sigma}{d\Omega}, A_{LT'}, A_t, A_{et}$
	1.08-1.16	2.00-4.50	$\frac{d^2\sigma}{d \cos \theta_\pi d\varphi_\pi}$
	1.10-1.39	3.00-6.00	$\frac{d\sigma}{d\Omega}$
$n \pi^+$	1.10-1.38	0.16-0.36	$\frac{d\sigma}{d\Omega}$
	1.10-1.55	0.30-0.60	$\frac{d\sigma}{d\Omega}$
	1.10-1.70	1.70-4.50	$\frac{d\sigma}{d\Omega}, A_{LT'}$
	1.60-2.00	1.80-4.50	$\frac{d\sigma}{d\Omega}$

Нуклонные резонансы, для которых получены амплитуды электровозбуждения из анализа данных CLAS

Эксклю- зивные каналы	Возбуждённые состояния протона	Диапазон по Q^2 в реакции $\gamma_p p N^*$, ГэВ ²
$p \pi^0, n \pi^+$	$\Delta(1232) 3/2^+$	0.16-6.00
	$N(1440) 1/2^+, N(1520) 3/2^-, N(1535) 1/2^-$	0.30-4.16
$n \pi^+$	$N(1675) 5/2^-, N(1680) 5/2^+, N(1710) 1/2^+$	1.60-4.50